

ON/OFF REGISTRERING

Navn _____ Dato _____

⌚	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03
+3																								
+2																								
+1																								
0																								
-1																								
-2																								
-3																								

Tremor

0																								
1 - moderat																								
2 - kraftig																								

Dystoni

0																								
1 - moderat																								
2 - kraftig																								

Note

⌚	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03
Morgendose																								
Kontinuerligdose																								
Ekstradose																								

Support-telefon: 407 60 813

Bevegelighet 1,2

+3 ON	• Mye overrørighet: ufrivillige bevegelser som forstyrrer frivillig bevegelse • Ufrivillige bevegelser i hele kroppen • Både armbevegelser og gange er forstyrret av voldsomme ufrivillige bevegelser • Så store ufrivillige bevegelser at han/hun risikerer å falle av stol/seng • Kan ikke drikke av kopp/glass uten å søle
+2 ON	• Tydelig overrørighet: kontinuerlig bevegelse selv ved hvile • Ufrivillige bevegelser i hele kroppen eller i noen kroppsdelar • Finger og armbevegelser er påvirket av ufrivillige bevegelser • Gange er påvirket av ufrivillige bevegelser • Klarer ikke å stå stille • Har ballansekontroll og klarer å drikke av glass
+1 ON	• Noe overrørighet: synlige små ekstrabevegelser • Ufrivillige bevegelser i noen kroppsdelar • Akseptable finger- og armbevegelser • Normal gange med normale armbevegelser og skrittlengde • Kan være stille i 5-15 sekunder • Pasienten syntes ofte selv at dette nivået er optimalt • Klarer å drikke vann uten problemer
0 NORMAL	• Normal bevegelighet: ON uten symptomer og dyskinesier • Raske bevegelser i fingre og armer • God skrittlengde og normale armbevegelser ved gange • Ingen tydelige bevegeliforstyrrelser (dyskinesier)
-1 OFF	• Noestivhet • Langsomme/trege bevegelser i fingre og armer. Noe nedsatt svingvidde • Noe fingertremor • Reiser seg fra stol uten problemer • Langsom gange med noe redusert skrittlengde og noe reduserte armbevegelser • Ingen nøling eller stopp (freezing) • Pasienten føler seg stiv
-2 OFF	• Middels stivhet: tydelige langsomme bevegelser • Langsomme bevegelser i fingre og armer • Noe fingertremor • Har problemer med å reise seg fra stol. Kan trenge hjelp fra liggende til sittende stilling • Startvansker ved gange, kan trenge assistanse • Subbende gange med korte skritt, ikke naturlige armbevegelser • Tendens til freezing når han/hun skal snu/vende
-3 OFF	• Veldig stiv: veldig langsam bevegelse i ekstremiteter • Fremoverbøyd kroppsholdning • Åpen munn • Langsomme bevegelser i fingre og armer • Kan ikke reise seg fra stol og klarer selvsagt ikke å gå • Klarer ikke å reise seg fra liggende til stående stilling • Svelgproblemer (sikler)

AbbVie

Postboks 565, 1327 Lysaker, Norge. Telefon: 67 81 80 00.

Copyright © 2016 AbbVie. All rights reserved.

NO-DUOD-250002, v.1, Feb 2025

Referanse: 1. Nyholm D., Nilsson Remahl A., Dizdar N. et al. Duodenal levodopa infusion monotherapy vs oral polypharmacy in advanced Parkinson disease. Neurology. 2005 Jan 25;64(2):216-23. 2. Utarbeidet av AbbVie basert på Goetz CG1, Tilley BC, Shaftman SR et al. Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): scale presentation and clinimetric testing results. Mov Disord. 2008 Nov 15;23(15):2129-70

abbvie