

# Klargjøring av pasienten for innleggelse av PEG/J

## Før operasjonen:

- Pasienten skal faste over natten, minst 8 timer
- Pasienten skal ha utført munnstell
- Pasienten skal gis profylaktisk antibiotika i henhold til sykehusets retningslinjer
- Ha gjeldende koagulasjonsstatus i henhold til lokale retningslinjer
- Skal pasienten legges i ryggeleie før operasjonen
- Pasienten bekreftes å være i stabil medisinsk tilstand, uten nylig infeksjon og ha en adekvat ernæringsstatus (albumin > 30g/liter)
- Kun drikke klar væske, opptil 2 timer før PEG-J-operasjonen
- Send med pasienten rett utstyr fra Abbvie slik at det er kompatibelt med medisinkassett

## På operasjonsdagen skal pasienten:

- Fortsette med å ta sine nåværende parkinsonmedisiner, for å hindre stivhet under operasjonen.
- Kun drikke klar væske, opptil 2 timer før PEG-J-operasjonen

## Etter operasjonen:

- Behandlingen med Duodopa kan normalt starte direkte etter innleggelse av PEG-J, dersom PEG-innleggelsen har foregått uten komplikasjoner, etter konsultasjon av gastroenterologen
- Oral ernæring kan være mulig etter 2 timer. Følg sykehusets retningslinjer
- Påminn pasienten om å ikke røre sårbandasjen de første 48 timene etter innleggelse, så fremt bandasjen ikke er gjennomtrukket. Se etter tegn på komplikasjoner som smerte, eller blødning
- Gastroenterolog/kirurg eller spesialist bør undersøke pasienten før utskriving

